


# Übersicht und Wegbeschreibung



## So finden Sie uns



**Donauklinik Neu-Ulm**  
 Krankenhausstraße 11 | 89231 Neu-Ulm  
 Tel. 0731 / 804-0 | [www.donauklinik-neu-ulm.de](http://www.donauklinik-neu-ulm.de)



### Mit dem Bus

Die Haltestelle „Donauklinik“ (Linie 7) befindet sich direkt vor dem Haupteingang.

### Parken

Eine begrenzte Anzahl von kostenpflichtigen Parkplätzen finden Sie direkt vor dem Klinikgebäude. Wenn diese belegt sind, können Sie auf dem Parkplatz des Edwin-Scharff-Haus direkt neben der Donauklinik Ihr Auto abstellen. Von dort erreichen Sie uns in 5 Minuten zu Fuß.



**Information für tageschirurgische Operationen**

Donauklinik Neu-Ulm

## Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

bei Ihnen besteht eine Erkrankung bzw. Verletzung, die eine tageschirurgische Operation erforderlich macht.

### Im Vorfeld haben wir für Sie zunächst einen Termin für die Narkosevoruntersuchung

am ..... um ..... Uhr in unserer

#### Anästhesie-Ambulanz

Tel.: 0731 / 804-1405 vereinbart.

Bitte bringen Sie zu diesem Anästhesietermin ärztliche Befunde (z. B. aktuelle Laborwerte, EKG, Rö/CT-Bilder, Befundberichte) und die OP-Einwilligung mit.

### Wir haben im Weiteren für Sie einen Operationstermin vorgemerkt und bitten Sie,

am ..... um ..... Uhr

nüchtern  nach dem Frühstück  
in unser Krankenhaus zu kommen. Bitte melden Sie sich zuerst in der Patientenaufnahme (Eingangshalle links) an.

Sollten Sie den vereinbarten OP-Termin nicht wahrnehmen können oder Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte an die jeweilige Fachabteilung

#### Chirurgie

Tel. : 0731 / 804-2201

#### Gynäkologie und Geburtshilfe

Tel. 0731 / 804 - 2806

## Bitte folgende Dinge beachten

### 1. Im Vorfeld

#### Medikamenteneinnahme

Um die Behandlung vor der Operation so kurz wie möglich zu halten, bitten wir Sie zusammen mit Ihrem einweisenden Arzt um die Beachtung folgender Hinweise:

- Blutverdünnende Medikamente (z. B. Aspirin, ASS, Aggrenox®, Colfarit®, Godamed®, Plavix®, Eliquis®, Pradaxa® Xarelto®, u.ä. besonders aber Marcumar®, Eliquis, Xarelto, Pradaxa) müssen nach Rücksprache mit Ihrem Arzt je nach Wirkstoff zwischen 1 und bis zu 10 Tage vor der Operation ausgesetzt und ggf. durch „Antithrombose-Spritzen“ ersetzt werden.
- Metforminhaltige Tabletten bei Zuckerkrankheit (z. B. Biocos®, Diabetase®, Glucophage®, Siofor® u.a.) müssen 1 Tag vor der Operation ausgesetzt werden.
- Depressionsmedikamente: MAO-Hemmer (z. B. Jatrosom® und Bernate®) müssen 14 Tage vor der Operation ausgesetzt werden. Tri- und Tetrazyklische Antidepressiva (z. B. Amineurin®, Anafranil®, Aneuril®, Aponal®, Depriplept®, Equilibrin®, Gamonil®, Herphonal®, Hydiphen®, Idom®, Insidon®, Kanopan®, Laroxyl®, Ludiomil®, Mapro-Gry®, Maprolu®, Mapro-Tablinen®, Maprotilin®, Mirpan®, Nortilen®, Noveril®, Novoprotect®, Pertofran®, Petrylyl®, Prisma®, Pryleugan®, Psymon®, Saroten®, Siquam®, Stangyl®, Tofranil®, Tolvan®) auch Kombinationspräparate (z. B. Limbratil®, Longopax®) müssen 24 Stunden vor der Operation ausgesetzt werden..



### 2. Am OP-Tag

#### Bitte bringen Sie folgendes am OP-Tag mit:

1. Überweisungsschein
2. Falls noch nicht bei uns vorliegen, ärztliche Befunde (z. B. aktuelle Laborwerte, EKG, Rö/CT-Bilder, Befundberichte). Diese erhalten Sie i.d.R. von Ihrem einweisenden Arzt / Hausarzt.

#### Bitte entfernen Sie am OP-Tag folgendes zu Hause oder legen Sie dieses in der Umkleide ab:

1. Metallische Gegenstände, wie Schmuck, Piercings und Haarklammern
2. Hörgeräte und Zahnprothesen
3. Schminke und Nagellack
4. Öle und Cremes von der Haut des OP-Gebietes

#### Nüchternheit

6 Stunden vor der OP nicht mehr essen und 2 Stunden vor der OP nicht mehr trinken und nicht mehr rauchen.

Bis 6 Stunden vor Narkose bzw. vor Regionalanästhesie kann bei elektiven Eingriffen eine kleine Mahlzeit eingenommen werden (z. B. eine Scheibe Weißbrot mit Marmelade und ein Glas Milch).

Klare Flüssigkeiten, die kein Fett, keine Partikel und keinen Alkohol enthalten können in kleinen Mengen (max. 100 – 200ml) bis zu 2 Stunden vor Narkosebeginn getrunken werden (z. B. Wasser, Saft ohne Fruchtfleisch, Limo, Tee oder Kaffee ohne Milch).

Medikamente können am OP-Tag mit einem Schluck Wasser bis kurz vor der Narkose eingenommen werden.

### 3. Maßnahmen nach der OP:

- Sie bringen die Telefonnummer von Ihrem „Chauffeur“ mit
- Eine Begleitperson (volljährig) holt Sie ab
- Sie bringen eine Kleinigkeit zum Essen mit, falls Sie in der Wartezeit nach der Operation Hunger bekommen
- Eine Person (volljährig) beaufsichtigt Sie 24 Stunden zu Hause
- Sie dürfen 24 Stunden nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen
- Sie dürfen 24 Stunden keinen Alkohol trinken, nicht an Maschinen arbeiten, keine Verträge abschließen

#### Bereitschaftsdienst

Es existiert eine 24 Stunden Dienstbereitschaft der Operateure und der Anästhesisten. Bei Fragen wenden Sie sich an Tel. 0731 / 804-0.

[www.donauklinik-neu-ulm.de](http://www.donauklinik-neu-ulm.de)

